

Kurzbeschreibung der bestimmten Anbaugebiete für Qualitätswein

Ahr

| | |
|-----------------|--|
| Rebfläche: | 561 ha; Weißweinrebläche = 16,8% / Rotweinrebläche = 83,2% |
| Höhenlage: | 90 - 310 m über NN |
| Böden: | Sandiger Lehm, Grauwacke und Schiefer |
| Hauptrebsorten: | Spätburgunder, Riesling, Frühburgunder, Portugieser |

Baden

| | |
|-----------------|--|
| Rebfläche: | 15.834 ha; Weißweinrebläche = 59,2% / Rotweinrebläche = 40,8% |
| Höhenlage: | 120 - 530 m über NN |
| Böden: | Jura, Granit- und Gneisverwitterung, Keuper, Löss, Lehm, Mergel, Moräne, Muschelkalk, Sandstein und Vulkanische Gesteine |
| Hauptrebsorten: | Spätburgunder, Müller-Thurgau, Grauburgunder, Weißburgunder, Gutedel, Riesling |

Franken

| | |
|-----------------|---|
| Rebfläche: | 6.139 ha; Weißweinrebläche = 81,6% / Rotweinrebläche = 18,4% |
| Höhenlage: | 120 - 415 m über NN |
| Böden: | Buntsandstein, Gips- und Lettenkeuper, Löss, Lehm, Muschelkalk und Sand |
| Hauptrebsorten: | Müller-Thurgau, Silvaner, Bacchus, Riesling, Domina und Spätburgunder |

Hessische Bergstraße

| | |
|-----------------|--|
| Rebfläche: | 462 ha; Weißweinrebläche = 79,4% / Rotweinrebläche = 20,6% |
| Höhenlage: | 110 - 245 m über NN |
| Böden: | Melaphyr, Porphyry, Sand, Löss, Lehm, Kies, Granitverwitterung und Buntsandstein |
| Hauptrebsorten: | Riesling, Grauburgunder, Spätburgunder, Müller-Thurgau, Weißburgunder |

Mittelrhein

| | |
|-----------------|--|
| Rebfläche: | 469 ha; Weißweinrebläche = 85,3% / Rotweinrebläche = 14,7% |
| Höhenlage: | 55 - 328 m über NN |
| Böden: | Grauwacke, Schiefer und tonig-sandiger Lehm |
| Hauptrebsorten: | Riesling, Spätburgunder und Müller-Thurgau |

Mosel

| | |
|-----------------|--|
| Rebfläche: | 8.770 ha; Weißweinrebläche = 90,5% / Rotweinrebläche = 9,5% |
| Höhenlage: | 65 - 380 m über NN |
| Böden: | Schiefer, Quarzitische Sandsteine, tonig-sandiger Lehm, Mergel und Muschelkalk |
| Hauptrebsorten: | Riesling, Müller-Thurgau, Elbling, Spätburgunder, Weißburgunder |

Nahe

| | |
|-----------------|---|
| Rebfläche: | 4.225 ha; Weißweinrebläche = 75,8% / Rotweinrebläche = 24,2% |
| Höhenlage: | 80 - 380 m über NN |
| Böden: | Sand, tonig-sandiger Lehm, Mergel, Schiefer und Quarzit |
| Hauptrebsorten: | Riesling, Müller-Thurgau, Dornfelder, Grauburgunder, Weißburgunder, Spätburgunder, Silvaner |

Pfalz

| | |
|-----------------|--|
| Rebfläche: | 23.652 ha; Weißweinrebläche = 64,9% / Rotweinrebläche = 35,1% |
| Höhenlage: | 92 - 360 m über NN |
| Böden: | Buntsandstein, Kies, Sand, sandiger Lehm, Löss, Kalk und Mergel |
| Hauptrebsorten: | Riesling, Dornfelder, Müller-Thurgau, Spätburgunder, Grauburgunder, Portugieser, Weißburgunder, Kerner |

Rheingau

| | |
|-----------------|--|
| Rebfläche: | 3.191 ha; Weißweinrebläche = 85,5% / Rotweinrebläche = 14,5% |
| Höhenlage: | 80 - 270 m über NN |
| Böden: | Schiefer, Quarzit, Buntsandstein, Ton, Lehm und Löss |
| Hauptrebsorten: | Riesling und Spätburgunder |

Rheinhessen

| | |
|-----------------|---|
| Rebfläche: | 26.617 ha; Weißweinrebläche = 70,9% / Rotweinrebläche = 29,1% |
| Höhenlage: | 80 - 300 m über NN |
| Böden: | Gesteinsverwitterung, tonig-sandiger Lehm, Kies, Ton, Löss, Rotliegendes und Mergel |
| Hauptrebsorten: | Riesling, Müller-Thurgau, Dornfelder, Silvaner, Grauburgunder, Spätburgunder, Weißburgunder, Portugieser und Kerner |

Saale-Unstrut

| | |
|-----------------|---|
| Rebfläche: | 772 ha; Weißweinrebläche = 74,5% / Rotweinrebläche = 25,5% |
| Höhenlage: | 38 – 240 m über NN |
| Böden: | Wellenkalk und roter Sandstein |
| Hauptrebsorten: | Müller-Thurgau, Weißburgunder, Riesling, Dornfelder, Silvaner, Bacchus, Grauburgunder |

Sachsen

| | |
|-----------------|--|
| Rebfläche: | 497 ha; Weißweinrebläche = 81,9% / Rotweinrebläche = 18,1 % |
| Höhenlage: | 70 – 280 m über NN |
| Böden: | Granitverwitterung, Löss- und Sandböden |
| Hauptrebsorten: | Müller-Thurgau, Riesling, Weißburgunder, Grauburgunder und Spätburgunder |

Württemberg

| | |
|-----------------|---|
| Rebfläche: | 11.360 ha; Weißweinrebläche = 31,3% / Rotweinrebläche = 68,7% |
| Höhenlage: | 155 - 500 m über NN |
| Böden: | Muschelkalk, Keuper, lehmiger Ton, Mergel, Löss, Molasse und Sand |
| Hauptrebsorten: | Trollinger, Riesling, Lemberger, Schwarzriesling (Müllerrebe) und Spätburgunder |

Stand für bestockte Rebflächen: 31. Juli 2017